1915 — N° 6

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda
in minimis.

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1915

Le Bulletin paraît deux fois par mois.

AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3e trimestre des *Annales* de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4e fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le 1er octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte : pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et soufflage de chenilles.

Mlle C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (Ve).

Envoi du tarif sur demande.

Cabinet entomologique E. LE MOULT

4, rue Duméril, PARIS

Vient de paraître : le *Catalogue des Lépidoptères*, qui est envoyé franco sur demande.

Je viens de recevoir ces jours-ci quelques beaux exemplaires du rarissime et superbe Coléoptère « **Mouhotia Batesi** » et d'une autre espèce voisine, non encore déterminée.

J'ai également reçu deux nouvelles espèces d'Ornithoptères : **Ornithoptera Joiceyi** et **Or. Rothschildi.**

Arrivages continuels d'insectes rares de tous ordres de tous les points du globe.

Envoi franco sur demande des Catalogues de Coléoptères et Listes supplémentaires.

Je viens de faire construire une loupe entomologique (marque française, fabrication extra-soignée), d'un grossissement de 20 à 30 fois au choix.

Prix : **25** francs (0 fr. 75 en plus pour la gaine).

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 24 mars 1915.

Présidence de M. Ét. RABAUD.

Nouvelles de nos Collègues aux Armées. — Nous avons reçu récemment de bonnes nouvelles de nos deux Secrétaires, le Dr R. JEANNEL et le Dr M. ROYER, ainsi que de MM. J. ACHARD, le Dr BETTINGER, E. FLEUTIAUX et D. LUCAS.

Le Dr M. BEDEL, encore blessé deux fois depuis peu, a pu cependant jusqu'ici ne pas interrompre son service.

Subvention. — La Société a reçu du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts une subvention de 350 francs.

Collections. — Le Président annonce que le Laboratoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle est entré en possession de la précieuse collection d'Hyménoptères de J. PÉREZ, collection qui lui a été léguée par notre regretté Membre honoraire.

— Le Président fait également savoir que la bibliothèque Laboulbène a été donnée au Laboratoire d'Entomologie du Muséum par la veuve du Dr A. LABOULBÈNE, ancien Président de notre Société.

Communications.

Description d'un *Heterocerus* de Chine [COL. HETEROCERIDAE]

par A. GROUVELLE.

Heterocerus stultus, n. sp. — *Oblongus, circiter 2 et 1/2 longior quam latior, convexus, nitidulus, nigro-brunneus, elytris fusco-rufo variegatis; antennis pedibusque rufis, his plus minusve infuscatis.*

Caput valde transversum, fronte convexiusculum, antice sinuatum, pube flavo-fusca, brevissima, densissime vestitum, dense punctulatum; labro transverso, apice truncato, angulis anticis rotundato. Prothorax valde transversus, basin versus vix angustatus; angulis anticis obtusis; lateribus antice brevissime subrectis et parallelis, dein arcuatis; angulis posticis rotundatis; basi utrinque haud marginata; disco infuscato, ad angulos anticos et ante scutellum rufescente, punctis minimis et minutissimis crebre punctato; pilis fulvo-testaceis, stratis, sat dense vestito, pilis longioribus, erectis, praecipue ad marginem anticum et ad latera intermixtis. Elytra humeris breviter rotundata, parallela, apice breviter rotundata, circiter 1 et 1/2 longiora quam simul latiora, dense et quam prothorax validius punctata, subdense subtiliterque fulvo-pubescentia; singulo elytro fulvo marginato et quatuor maculis fulvis ornato : 1ª macula basilari, prope suturam, in longitudinem elongata; 2ª humerali, latus attingente, oblongo-elongata, maculam nigram includente; 3ª laterali, intus in formam litterae Z transversim producta; 4ª apicali, prope suturam, in longitudinem oblongo-elongata. Corpus subtus infuscatum, flavo-pubescens. — Long. 4-4,2 mm.

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large, convexe, un peu brillant, noir brunâtre, varié, principalement sur les élytres, de fauve rougeâtre ; antennes rougeâtres, pattes en partie de la même couleur, en partie plus ou moins enfumées. Antennes de 10 articles. Tête environ deux fois plus large, avec les yeux, que longue avec les mandibules; légèrement convexe sur le front, densément pointillée, couverte d'une pubescence flave-enfumée très courte et très serrée ; bord antérieur sinué; côtés fortement sinués en avant des yeux, ceux-ci un peu saillants, à facettes moyennes ; labre environ deux fois plus large à la base que long, tronqué en avant, largement arrondi aux angles antérieurs. Prothorax à peine rétréci à la base, environ deux fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que long, plus ou moins rougeâtre sur les angles antérieurs, les marges latérales et la marge basilaire devant l'écusson, couvert d'une ponctuation plus forte que celle de la tête, entremêlée de très petits points; pubescence fauve-testacée, plus ou moins couchée, assez dense, entremêlée, surtout sur les marges antérieures et latérales, de longs poils dressés. Bord antérieur arqué en avant, brièvement sinué aux extrémités et bordé par un léger bourrelet qui se prolonge sur l'angle antérieur; celui-ci obtus; côtés très brièvement droits, subparallèles, puis arqués jusqu'à la base; angles postérieurs arrondis, non rebordés à la base; base arquée en arrière; troncature des angles postérieurs émoussée au bord supérieur, noirâtre. Écusson brun, oblong, un

peu enfoncé. Élytres étroitement arrondis aux épaules, parallèles, brièvement arrondis ensemble au sommet, environ une fois et demie plus longs que larges ensemble, couverts d'une ponctuation subrugueuse, plus forte et plus serrée que celle du prothorax, et d'une pubescence fauve, fine, assez dense. Chaque élytre bordé de roux fauve et marqué de quatre taches de la même couleur : 1re tache sur l'épaule, allongée, enfermant une tache noire; 2e basilaire, près de la suture, allongée, atteignant presque le tiers de la longueur de l'élytre; 3e vers le deuxième tiers de la longueur de l'élytre, partant de la bordure latérale et dessinant d'abord un profond sinus ouvert vers la base, puis un V à sommet très émoussé, orienté en sens inverse du sinus; 4e avant le sommet, près de la suture, partant de la bordure latérale et s'avançant longitudinalement en forme d'arc. Ces diverses taches disparaissent presque complètement chez les individus à coloration très foncée, et se soudent plus ou moins chez ceux qui ont une coloration générale plus claire, en particulier la 1re et la 2e tache se soudent alors avec les extrémités des branches du V de la 3e. Calus huméraux faiblement marqués. Dessous du corps brun noirâtre, couvert d'une pubescence flave, en partie assez longue. Marge externe de la bordure des plaques fémorales des hanches postérieures étroite, bien relevée, striée transversalement à la base. Lignes fémorales des hanches intermédiaires infléchies contre l'épisterne.

Chine : Tien-Tsin. — De nombreux exemplaires (collection A. Grouvelle).

Description d'un *Cyrtoxipha* [Orth. Gryllidae] de l'Afrique centrale

par L. Chopard.

Cyrtoxipha thoracica, n. sp. — *Minuta, gracilis; capite nigro, thorace latiore, oculis valde prominulis, clypeo rufescente, palpis nigris, articulo ultimo triangulariter dilatato; pronoto antice coarctato, margine postico recto; rufo, in ♀ maculis duabus minutis in medio marginis antici maculaque in lobis lateralibus nigris; pedibus omnibus femoribus fulvo-testaceis, anticis intus, intermediis extus linea longitudinali nigra; tibiis nigris, anticis utrinque foramine oblongo; tarsis articulo 1° testaceo, 2° et 3° infuscatis; alis longius caudatis, nigrescentibus.*

♂. *Elytris basi rufescentibus, campo dorsali albido iridescente,*

macula basali, fascia lata mediana apiceque nigris; tympani vena diagonali sinuata, speculo rhomboidali antice parum angulato; campo laterali venis tribus parum sinuatis, vena mediastina a vena humerali remota.

♀. *Elytris ovatis, nigris, apice hyalinis; campo dorsali venis longitudinalibus elevatis 3-4 completis incompletisque 3-5, campo laterali ut in ♂ venato, ovipositore testaceo valvis fere ejus dimidiam longitudinem occupantibus.*

Long. corp. ♂ 6,5 mm., ♀ 6 mm.; *long. corp. cum alis* ♂, ♀ 11,5 mm.; *pronot.* 1,4 mm.; *elytr.* 5 mm.; *fem. ant.* 2,5 mm.; *fem. post.* 5,5 mm.; *tib. post.* 5,5 mm.; *ovipos.* 2,4 mm.

Types : 1♂,1 ♀ de Fort-Crampel (Haut-Oubanghi).— Ma collection.

Espèce de taille assez petite, de forme grêle et à coloration très remarquable : corps brunâtre avec la tête noire, le pronotum d'un rougeâtre assez vif, les fémurs jaunes avec une ligne noire longitudinale à la face interne aux antérieurs, à la face externe aux intermédiaires, les tibias entièrement noirs. Élytres d'un blanc irisé chez le mâle, un peu rougeâtres à la base et marqués d'une grande tache basale, d'une large fascie médiane et d'une tache apicale noires; chez la ♀ les élytres sont noirs, à l'exception de l'apex et de la suture qui sont transparents. Dans les deux sexes, les ailes sont longuement caudées, noirâtres dans le champ antérieur, d'un blanc irisé dans le champ postérieur.



Fig. 1.— *Cyrtoxipha thoracica*, n. sp. ♂, ♀, ×6.

Tête noire, subglobuleuse, un peu plus large que le pronotum, à

vertex déclive formant avec la face un angle presque droit; une fine carène arquée, surtout visible chez le ♂, partant de chaque œil et s'unissant avec la correspondante au milieu du rostre frontal; celui-ci court, arrondi, un peu plus large que le 1er article des antennes; écusson facial large, bombé; clypeus rectangulaire, à bord supérieur un peu convexe, rougeâtre dans sa moitié inférieure; labre noir, étroit, bombé. Antennes à 1er article large, déprimé, le bord interne moitié plus court que le bord externe, les articles suivants petits, courts, devenant rapidement cylindriques et grêles; la base de l'antenne noire. Pièces buccales noires; palpes maxillaires entièrement noirs, à 1er et 2e articles très courts, 3e grêle, un peu courbé, 4e égal environ aux 2/3 du 3e, fortement dilaté à l'apex, 5e de la longueur du 3e, largement dilaté en triangle, son bord inférieur un peu sinué; palpes labiaux noirs également, à 1er article très court, 2e un peu plus long, légèrement convexe, 3e grand, triangulaire, obliquement tronqué au sommet, à angles vifs, le bord supérieur droit, le bord inférieur sinué. Pubescence assez abondante sur toute la tête avec quelques longues soies sur le rostre frontal.

Pronotum rougeâtre avec deux petites taches noires au milieu du bord antérieur, surtout visibles chez la ♀, les lobes latéraux bordés de noir; bord antérieur fortement convexe, bord postérieur à peine sinué; lobes latéraux peu élevés, un peu rétrécis au-dessus de la base, à angle antérieur très largement arrondi, angle postérieur presque droit; disque marqué d'un petit sillon médian et de deux impressions piriformes latérales. Pubescence assez rare, courte et dressée avec quelques longues soies au bord antérieur. Dessous du thorax noir; prosternum très étroit, les hanches antérieures se touchant presque; mésosternum rétréci en arrière; métasternum largement arrondi au bord postérieur.

Abdomen noir, à fine pubescence blanchâtre; plaques suranale et sous-génitale de même forme dans les deux sexes, la première petite, quadrangulaire à angles arrondis, la seconde assez grande, un peu comprimée, arrondie à l'apex. Cerques assez longs, jaunes.

Pattes assez longues et grêles. Pattes antérieures : hanches et trochanters jaunes, hanches courtes, comprimées à la face externe; fémurs cylindriques un peu renflés à la base, jaunes avec une ligne noire assez large à la face interne; tibias noirs, un peu renflés au milieu, armés de deux éperons inférieurs assez longs; les tympans grands, ovalaires, de même forme et même taille sur les deux faces du tibia; tarses courts, les métatarses atteignant presque les 2/3 de la longueur totale, épais, carénés en dessous; 2e article cordiforme,

3e article long et grêle; métatarses jaunâtres, 2e et 3e articles noirâtres. Pattes intermédiaires de même forme et même coloration que les pattes antérieures, la ligne noire des fémurs située sur la face externe. Pattes postérieures à fémurs assez fortement renflés, présentant une ligne noire longitudinale peu nette à la face externe; tibias noirs, très grêles, à épines longues, velues, les 3 externes jaunâtres, subégales, les 3 internes noirâtres, la médiane un peu plus longue que les deux autres; éperons internes noirâtres, le supérieur un peu plus



Cyrtoxipha thoracica, n. sp.

Fig. 2. — Champ latéral de l'élytre ♂, ♀, × 6. — Fig. 3. — Tarse antérieur, × 15. — Fig. 4. — Tarse postérieur, × 15. — Fig. 5. — *a*, palpe maxillaire; *b*, palpe labial, × 12. — Fig. 6. — Extrémité abdominale du ♂, vue de dessus, × 10. — Fig. 7. — Extrémité abdominale de la ♀ et oviscapte, vu de profil, × 10.

fort que la dernière épine interne, l'inférieur environ moitié moins long que le supérieur; métatarses jaunes à éperons noirâtres, l'interne un peu plus long que le 2e article du tarse; denticules apicaux assez forts; 2e et 3e articles gris noirâtres de même forme qu'aux autres paires de pattes. Pubescence assez abondante sur les pattes, métatarses postérieurs assez longuement ciliés.

♂. — Élytres étroits, rougeâtres à la base et présentant une tache

noire s'étendant de cette partie basale rougeâtre jusqu'à la nervure anale; le reste de l'élytre divisé en quatre parties presque égales alternativement d'un blanc irisé et noires, la première bande noire forme une large fascie s'étendant sur toute la largeur de l'élytre et atteignant l'angle antérieur et le milieu du miroir; vers le bord externe de l'élytre, la partie enfumée gagne presque jusqu'à l'angle de la nervure anale; la deuxième bande noire occupe l'apex de l'élytre depuis l'angle postérieur du miroir. La veine diagonale est assez courte, bisinuée; la veine oblique, fortement convexe dans sa partie basale, est presque droite et parallèle au miroir dans sa partie apicale; le miroir est très grand, rhomboïdal, irrégulier, à angle antérieur peu aigu, presque droit, angles externe et inférieur arrondis, angle interne presque nul, sa partie antérieure plus longue que la partie postérieure; veine enveloppante bien marquée, ses deux branches se joignant à l'apex du miroir; champ apical très court, lisse. Veine humérale un peu sinuée, courbée vers le bas à son extrémité et reliée à la médiane par une courte veinule qui forme le stigma; veine médiastine très écartée de la veine humérale, fortement courbée à sa base, presque droite ensuite; il existe deux autres nervures latérales parallèles à la médiastine.

Les pièces génitales sont complètement invisibles sans préparation, la plaque sous-génitale venant presque en contact avec les valves anales; après éclaircissement à la potasse, on voit une grande pièce chitineuse supérieure en forme de U entre les branches de laquelle se trouve une pièce plus petite figurant un W; à l'extrémité de la pièce en U s'articulent quatre valves arrondies à l'apex et garnies de soies, leur bord externe fortement chitinisé, leur bord interne membraneux; entre ces valves débouche un pénis assez volumineux, arrondi à l'apex.



Fig. 8. — Pièces génitales du ♂ de *Cyrtoxipha thoracica*, n. sp., × 32.

♀. — Élytres allongés, de forme ovale dans leur ensemble, noirs sauf l'apex et le bord sutural (surtout à l'élytre gauche) qui sont transparents; champ dorsal occupé par des nervures longitudinales saillantes, convergentes à l'apex, au nombre de 3 à l'élytre gauche, 4 à l'élytre droit; la plus interne de ces nervures est bifurquée à sa base, les 2 ou 3 autres naissent par une ou deux bifurcations de la nervure externe et sont liées par une branche transversale à la ner-

vure interne; entre ces nervures complètes se trouvent des nervures incomplètes et de fausses nervures qui forment des stries serrées; les nervules transversales sont très rares. Le champ latéral présente une disposition analogue à celle du ♂, mais la nervure médiastine est encore plus éloignée de l'humérale; entre cette dernière et la médiane existe un champ assez large muni d'une nervure incomplète; les deux nervures latérales sont sinuées, parallèles.

Oviscapte à partie apicale occupant presque la moitié de la longueur totale et séparée, à la valve inférieure, par un repli oblique dirigé en arrière, à la valve supérieure par trois petits tubercules; apex très aigu, les valves supérieures et inférieures finement dentées, les valves inférieures présentant quelques ondulations avant l'apex.

Cette espèce présente une coloration assez vive et très caractéristique; elle se distingue en outre des autres espèces du genre par l'étroitesse des élytres et la forme du pronotum qui est très arrondi en avant et un peu comprimé au-dessous du milieu.

Bulletin bibliographique.

Bergevin (E. de) : A propos de *Ælia triticiperda* Pomel (Hem.), fléau des céréales. (*Bull. Soc. Hist. nat. Afr. N.*, VII, 1915, p. 18-23), fig. *

Chapman (T.-A.) : An analysis of the species of the genus *Curetis*, chiefly based on an examination of the specimens in the zoological Museum, Tring. (*Novit. Zool.*, XXII, 1915, p. 80-104, pl. 3-19.)*

Canadian Entomologist (*The*), XLII, 2, 1915. — Dod (F.-H.-W.) : Notes on Alberta Lepidoptera; p 33. — Girault (A.-A.) : Chalcidoid Hymenoptera from N. Queensland; p. 42. — Caesar (L.) : Popular and economic entomology. Deformed apples and causes; p. 49, fig. — Id. : Imported red spider on fruit trees; p. 57, fig. — Johnson (C.-W.) : A new species of *Nephrocerus*; p. 54. — Swett (L.-W.) : Revision of the genus *Hydriomena*; p. 58. — Id. : Geometrid notes; p. 64. — Girault (A.-A.) : A new Australian species of *Camptoptera*; p. 65.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL.

Crustacés : I, *Phyllopoda*, par E. DADAY DE DEÉS.
II, *Amphipoda*, par E. CHEVREUX.

Arachnides : I, *Opiliones*, par le Dr C.-Fr. ROEWER, avec une planche noire.
II, *Ixodidae*, par L.-G. NEUMANN.
III, *Araneae* (1re partie), par L. BERLAND.

Hémiptères : I, *Pentatomidae*, par le Dr R. JEANNEL, avec quatre planches noires.
II, *Naucoridae*, *Nerthridae*, *Belostomidae* et *Nepidae*, par A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : par le Dr R. JEANNEL, avec une planche noire.

Coléoptères : I, *Pselaphidae*, par A. RAFFRAY.
II, *Scarabaeidae* (*Onthophagini*), par H. D'ORBIGNY.
III, *Meloidae*, par M. PIC, avec une planche coloriée.
IV, *Hylophilidae* et *Anthicidae*, par M. PIC, avec une planche noire.
V, *Scarabaeidae*, par E. BENDERITTER, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, *Proctotrupidae*, *Cynipidae* et *Evaniidae*, par J.-J. KIEFFER.
II, *Formicidae*, par le Dr F. SANTSCHI, avec deux planches noires.
III, *Chrysididae* et *Vespidae*, par R. DU BUYSSON.
IV, *Braconidae*, par GY. SZÉPLIGETI.

Diptères : I, *Chironomidae* et *Cecidomyidae*, par J.-J. KIEFFER.
II, *Nematocera*, par F.-W. EDWARDS.

Myriapodes : I, *Chilopoda*, par H. RIBAUT, avec une planche noire et deux planches doubles.
II, *Symphyla*, par H. RIBAUT, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VIRIEUX, avec deux planches noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. DE BEAUCHAMP, avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le Dr J. PELLEGRIN, avec une planche noire.

Librairie de la Société entomologique de France (*suite*).

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par F. WALKER. London, 1859, in-8°. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe, in-8°, Moulins. (Extr. Rev. sc. Bourb.) :

I. *Nécrophages* (traduit de REITTER), 1890. . . — 1 fr.

II. *Colydiides, Rhysodides, Trogositides* (traduit de REITTER), 1891. . . . . 0 fr. 50

Histérides nouveaux (Description d'), par S. DE MARSEUL, in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.). . . . . 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. DE BONVOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 planches gravées. . . . . 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. RAGONOT, in-8°, 276 p., 4 pl. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pl. noires. . . . . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae *et* Galleriidae par E.-L. RAGONOT, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et description d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. RAGONOT, in-8°, 66 p., 1 pl. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch. Delagrange, par E.-L. RAGONOT, in-8°, 15 p. (Extr. Ann. Fr. 1895). . . . . 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. RAGONOT, Paris, 1887, in-8°, 20 p . . . . . 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. RAGONOT, in-8°, 58 p. . . . . 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. RAGONOT, in-4°, 52 p. (Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n. d. 5 et 6 fr.

Genera et Catalogue des Psélaphides, par A. RAFFRAY, in-8°, 621 p., 3 pl. (Extr. des *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1903). 20 et 25 fr.

Pour les *Membres* de la Société, les offres d'échanges, demandes de communications ou de renseignements d'ordre *purement scientifique*, qui n'excéderont pas *cinq* lignes, seront insérées *gratuitement* dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas *dix* lignes, elles coûteront 0 fr. 20 la ligne pour deux numéros.

La Société entomologique de France tient ses séances les 2e et 4e mercredis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, *rue Serpente*.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par an avec planches et figures) ;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient une cotisation annuelle de. . . . . 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. . . . . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans) qui paient une cotisation annuelle de. . . . . 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé **Membre à vie**. Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit *franco* les *Annales*, le *Bulletin*, et, *à titre de prime gratuite*, une série de dix volumes des *Annales* parmi ceux à *prix réduit* restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les *mardis*, *vendredis* et *samedis*, de 3 heures à 6 heures 1/2; le *mercredi*, de 8 *à* 10 *heures* 1/2 *du soir*.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul, continué par la **Société entomologique de France**, publie spécialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, *20, rue de l'Odéon*, est chargé de la publication du Journal (*examen et admission des mémoires et correspondance scientifique*).

Le montant des abonnements **L'Abeille** à (10 fr. ou 12 fr. *par volume*) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de la Société entomologique, 28, *rue Serpente*.

COLLECTIONS

1° Collection H. Sénac (*Tenebrionidae paléarctiques*),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (*Coléoptères d'Europe paléarctiques*),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon ;

3° Collection Peyerimhoff (*Microlépidoptères*),
4° Collection H. Brisout de Barneville (*Coléoptères d'Europe*),
5° Collection Aubé (*Coléoptères d'Europe*),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé (*Diptères de France*),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le Dr Gobert,
10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires *typiques*,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux dernières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les *Types* que les membres voudront bien envoyer, avec *localités précises*.

SOMMAIRE DU N° 6

Séance du 24 mars 1915

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Subvention. — Collections 105

COMMUNICATIONS

A. GROUVELLE. — Description d'un *Heterocerus* de Chine [COL. HETEROCERIDAE] 105
L. CHOPARD. — Description d'un *Cyrtoxipha* [ORTH. GRYLLIDAE] de l'Afrique centrale (fig.) 107

Bulletin bibliographique. 112

Pour la *correspondance scientifique*, les *réclamations et les annonces*, s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6e.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET Cie. — PARIS.